

ROUNDUP® RTU

**Erbicida sistemico ad azione totale di post-emergenza.
Liquido pronto all' uso.**

COMPOSIZIONE:

Glifosate sale isopropilamminico	g 0,96	(g/l 9,7)
(equivalenti a glifosate acido)	g 0,71	(g/l 7,2)
Acqua e coadiuvanti	q. b. a	g 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE s.a.s.

4 allée des Séquoias - 69760 Limonest (Francia) Tel. +33 (0)4 72866700

Officina di produzione:

Bayer Agriculture BVBA - Antwerp – Belgio

Prodotto conforme alle specifiche F.A.O.

Autorizzazione Ministero della Salute n. 8565 del 3.12.1994

Taglie: litri 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 2,50 - 3 - 5 - 10 - 20 - 50.

Partita n.: vedere sulla confezione.

CONSIGLI DI PRUDENZA

(P102) Tenere fuori dalla portata dei bambini; (P234) Conservare soltanto nel contenitore originale.

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI

(EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%. Divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell'uso non agricolo su: suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%; aree vulnerabili e zone di rispetto, di cui all'art.93, comma 1 e all'art.94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Informazioni per il medico: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

MODALITÀ D'IMPIEGO

Caratteristiche:

ROUNDUP RTU è un erbicida da impiegarsi dopo la nascita delle malerbe ed è praticamente efficace contro tutte le specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato fino alle radici ed agli organi sotterranei. ROUNDUP RTU non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente.

ROUNDUP RTU consente di seminare le superfici trattate dopo 48 ore dall'applicazione.

La comparsa dei sintomi di sofferenza nelle malerbe può impiegare da alcuni giorni a 2 - 3 settimane. Questo intervallo consente al prodotto di diffondersi fino alle radici e agli organi sotterranei e porta alla completa distruzione delle piante. Nel periodo successivo al trattamento la crescita delle piante risulta comunque bloccata.

Distribuzione

Distribuire uniformemente sulla vegetazione da distruggere senza che il prodotto sgoccioli.

Istruzioni per le confezioni normali

Utilizzare preferibilmente irroratori dotati di ugelli a specchio o a ventaglio e distribuire a bassa pressione (1 -2 bar). Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

Istruzioni speciali per le confezioni dotate di spruzzatore

Ruotare lo spruzzatore fino ad ottenere l'ampiezza dello spruzzo desiderata. Dopo l'uso riportare in posizione di "stop".

Istruzioni per l'uso per irroratore Pump' N Go

Si consiglia di indossare indumenti idonei ad evitare il contatto del prodotto con la pelle, quali guanti e calzature impermeabili. 1. APERTURA: tagliare le fascette bianche per liberare il tubo e la lancia irroratrice. 2. COLLEGAMENTO: collegare il tubo alla tanica come mostrato in figura. Questo sistema di attacco rapido, una volta collegato, necessita di forza per essere rimosso. 3. CARICAMENTO: con 20 pompate si ottengono 3 minuti di funzionamento. Dopo aver pompato serrare verso il basso la maniglia girandola in senso orario nella posizione di trasporto. 4.

ESTRAZIONE DELLO SPRUZZATORE: estrarre il corpo spruzzatore dall'alloggiamento tanica e, premendo il tasto giallo, estendere completamente la lancia irroratrice. 5. **IRRORAZIONE:** l'intensità della erogazione può essere regolata ruotando l'ugello posto in cima alla lancia. Indirizzare lo spruzzo verso le infestanti mantenendo una distanza di 30 - 50 cm da esse. Per erogare il prodotto mantenere premuto il pulsante bianco a scatto che è posto sul corpo dello spruzzatore. Irrorare con cura le infestanti evitando il gocciolamento del prodotto. 6. **DOPO L'USO:** premere il bottone giallo per rimettere in posizione di riposo la lancia irroratrice e riporre il corpo spruzzatore nell'alloggiamento previsto della tanica. Questo eviterà qualsiasi fuoriuscita accidentale di prodotto. 7. **PRIMA DI RIPORRE:** Spingere in basso la maniglia e girarla in senso antiorario per consentire lo scarico della pressione interna. La maniglia va nuovamente chiusa prima di riporre l'attrezzatura per un successivo utilizzo.

Istruzioni per l'uso della ricarica

Per ricaricare, rimuovere il tappo della tanica svitando in senso antiorario. Rimuovere il tappo sigillato della ricarica. Dopo l'uso rimettere questo tappo di chiusura per i successivi utilizzi. Seguire le istruzioni per l'uso dell'irroratore Pump' N Go o del vostro irroratore da giardino. Versare il contenuto della ricarica necessario nel vostro irroratore pulito e riservato a questo uso. Regolare l'erogazione ruotando l'ugello. Irrorare con cura le infestanti, ad una distanza di circa 30 - 50 cm da esse, evitando il gocciolamento del prodotto. Ruotare l'ugello su 'stop' dopo l'uso.

AVVERTENZE

L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse, come siccità, freddo, attacchi parassitari ha efficacia ridotta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento. Per consentire una corretta efficacia erbicida devono trascorrere 48 ore (infestanti annuali) e 15 giorni (infestanti perenni) prima che vengano effettuati tagli o lavorazioni.

Campi d'impiego

Roundup RTU va impiegato evitando il contatto con le piante utili quali:

- Culture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Viviali e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.

Culture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo; in tal caso l'applicazione del prodotto è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate).

- Prati, rose, viali.

- Culture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza. bulbosa da fiore.

- Terreni agrari in assenza della coltura.

- Aree non destinate alle colture agrarie. Aree rurali ed Industriali, Aree ed opere civili (ad esclusione delle aree di cui all'art. 15, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n. 150/2012 quali parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie), sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

Dosi d'impiego

250-500 l/ha (25 - 50 ml/mq). Adottare le dosi maggiori per le infestanti perenni e arbustive.

Nel caso di associazioni di specie diverse adottare la dose efficace per il controllo di quelle meno sensibili.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n. 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

ROUNDUP® RTU - PF_nPE

**Erbicida sistemico ad azione totale di post-emergenza.
Liquido pronto all'uso.**

COMPOSIZIONE:

Glifosate sale isopropilamminico	g 0,96	(g/l 9,7)
(equivalenti a glifosate acido)	g 0,71	(g/l 7,2)
Acqua e coadiuvanti	q. b. a	g 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE s.a.s.

4 allée des Séquoias - 69760 Limonest (Francia) Tel. +33 (0)4 72866700

Officina di produzione:

Bayer Agriculture BVBA - Antwerp - Belgio

Prodotto conforme alle specifiche F.A.O.

Autorizzazione Ministero della Salute n. 8565 del 3.12.1994

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

con validità fino 31 Dicembre 2022

Taglie: litri 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 2,50 - 3 - 5 - 10

Partita n.: vedere sulla confezione.

CONSIGLI DI PRUDENZA

(P102) Tenere fuori dalla portata dei bambini; (P234) Conservare soltanto nel contenitore originale.

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI

(EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare. Divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell'uso non agricolo su: suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%; aree vulnerabili e zone di rispetto, di cui all'art.93, comma 1 e all'art.94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Informazioni per il medico: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

MODALITÀ D'IMPIEGO

Caratteristiche:

ROUNDUP RTU è un erbicida da impiegarsi dopo la nascita delle malerbe ed è praticamente efficace contro tutte le specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato fino alle radici ed agli organi sotterranei. ROUNDUP RTU non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente. ROUNDUP RTU consente di seminare le superfici trattate dopo 48 ore dall'applicazione.

La comparsa dei sintomi di sofferenza nelle malerbe può impiegare da alcuni giorni a 2 - 3 settimane. Questo intervallo consente al prodotto di diffondersi fino alle radici e agli organi sotterranei e porta alla completa distruzione delle piante. Nel periodo successivo al trattamento la crescita delle piante risulta comunemente bloccata.

Distribuzione

Distribuire uniformemente sulla vegetazione da distruggere senza che il prodotto sgoccioli.

Istruzioni per le confezioni normali

Utilizzare preferibilmente irroratori dotati di ugelli a specchio o a ventaglio e distribuire a bassa pressione (1 -2 bar). Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

Istruzioni speciali per le confezioni dotate di spruzzatore

Ruotare lo spruzzatore fino ad ottenere l'ampiezza dello spruzzo desiderata. Dopo l'uso riportare in posizione di "stop".

Istruzioni per l'uso per irroratore Pump' N Go

Si consiglia di indossare indumenti idonei ad evitare il contatto del prodotto con la pelle, quali guanti e calzature impermeabili. 1. APERTURA: tagliare le fascette bianche per liberare il tubo e la lancia irroratrice. 2. COLLEGAMENTO: collegare il tubo alla tanica, questo sistema di attacco

rapido, una volta collegato, necessita di forza per essere rimosso. 3. CARICAMENTO: con 20 pompate si ottengono 3 minuti di funzionamento. Dopo aver pompato serrare verso il basso la maniglia girandola in senso orario nella posizione di trasporto. 4. ESTRAZIONE DELLO SPRUZZATORE: estrarre il corpo spruzzatore dall'alloggiamento tanica e, premendo il tasto giallo, estendere completamente la lancia irroratrice. 5. IRRORAZIONE: l'intensità della erogazione può essere regolata ruotando l'ugello posto in cima alla lancia. Indirizzare lo spruzzo verso le infestanti mantenendo una distanza di 30 - 50 cm da esse. Per erogare il prodotto mantenere premuto il pulsante bianco a scatto che è posto sul corpo dello spruzzatore. Irrorare con cura le infestanti evitando il gocciolamento del prodotto. 6. DOPO L'USO: premere il bottone giallo per rimettere in posizione di riposo la lancia irroratrice e riporre il corpo spruzzatore nell'alloggiamento previsto della tanica. Questo eviterà qualsiasi fuoriuscita accidentale di prodotto. 7. PRIMA DI RIPORRE: Spingere in basso la maniglia e girarla in senso anti-orario per consentire lo scarico della pressione interna. La maniglia va nuovamente chiusa prima di riporre l'attrezzatura per un successivo utilizzo.

Istruzioni per l'uso della ricarica

Per ricaricare, rimuovere il tappo della tanica svitando in senso antiorario. Rimuovere il tappo sigillato della ricarica. Dopo l'uso rimettere questo tappo di chiusura per i successivi utilizzi. Seguire le istruzioni per l'uso dell'irroratore Pump' N Go o del vostro irroratore da giardino. Versare il contenuto della ricarica necessario nel vostro irroratore pulito e riservato a questo uso. Regolare l'erogazione ruotando l'ugello. Irrorare con cura le infestanti, ad una distanza di circa 30 - 50 cm da esse, evitando il gocciolamento del prodotto. Ruotare l'ugello su 'stop' dopo l'uso.

AVVERTENZE

L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse, come siccità, freddo, attacchi parassitari ha efficacia ridotta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento. Per consentire una corretta efficacia erbicida devono trascorrere 48 ore (infestanti annuali) e 15 giorni (infestanti perenni) prima che vengano effettuati tagli o lavorazioni.

Campi d'impiego

Non utilizzare per il trattamento del giardino

-Terreni agrari in assenza della coltura.

250-500 l/Ha (25 - 50 ml/mq). Adottare le dosi maggiori per le infestanti perenni e arbustive.

Nel caso di associazioni di specie diverse adottare la dose efficace per il controllo di quelle meno sensibili.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi o sulla corteccia non ben lignificata di arbustive ed arboree presenti in prossimità dell'area incolta oggetto del trattamento.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n. 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua